

適用拡大登録

区 分	殺 虫 剤
農 薬 名	協友ベストガード粒剤
種 類 名	ニテンピラム粒剤
登 録 番 号	第 21609 号
登 録 日	令和 4 年 6 月 8 日

登録内容

- ・作物名「いちご」に適用病害虫名「チバクロバネキノコバエ」、使用方法「植穴処理土壌混和、生育期株元散布」を追加し、ニテンピラムを含む農薬の総使用回数「4回以内（定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内）」を「4回以内（定植時の土壌混和は1回以内、株元散布及び散布は合計3回以内）」に変更する。
- ・作物名「カリフラワー」および「ブロッコリー」のニテンピラムを含む農薬の総使用回数「5回以内（育苗期の散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、水溶剤の散布は3回以内）」を「5回以内（育苗期は1回以内、定植時は1回以内、定植後は3回以内）」に変更する。
- ・作物名「レタス」、「トマト」、「ミニトマト」および「きゅうり」のニテンピラムを含む農薬の総使用回数「4回以内（定植時までの処理は1回以内、水溶剤の散布は3回以内）」を「4回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後は3回以内）」に変更する。
- ・作物名「ねぎ」のニテンピラムを含む農薬の総使用回数「4回以内（定植時までの処理は1回以内、株元処理及び水溶剤の散布は合計3回以内）」を「4回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後は3回以内）」に変更する。
- ・作物名「ピーマン」、「ししとう」、「とうがらし類（ししとうを除く）」、「すいか」および「メロン」のニテンピラムを含む農薬の総使用回数「4回以内（育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内）」を「4回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後は3回以内）」に変更する。
- ・作物名「なす」のニテンピラムを含む農薬の総使用回数「4回以内（定植時までの処理は1回以内、株元散布及び水溶剤の散布は合計3回以内）」を「4回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後は3回以内）」に変更する。
- ・作物名「食用ぎく」のニテンピラムを含む農薬の総使用回数「4回以内（粒剤の散布は2回以内、水溶剤の散布は2回以内）」を「4回以内（株元散布は2回以内、散布は2回以内）」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ニテンタムを含む農薬の総使用回数
いちご	アブラムシ類	1g/株	定植時	1回	植穴処理 土壌混和	4回以内 (定植時の 土壌混和は 1回以内、 株元散布 及び散布は 合計3回以内)
	チハクハネ科ノコバエ	1～2g/株	収穫前日まで		3回以内	
カリフラワー	アザミヤカ類 アブラムシ類	セル成型育苗トレイ1箱 または ペーパーポット1冊 (30×60cm、使用土壌 約1.5～4L) 当り 50g	育苗期後半	1回	散布	5回以内 (育苗期は 1回以内、 定植時は 1回以内、 定植後は 3回以内)
	アブラムシ類	1g/株	定植時		植穴処理 土壌混和	
ブロッコリー	アザミヤカ類 アブラムシ類	セル成型育苗トレイ1箱 または ペーパーポット1冊 (30×60cm、使用土壌 約1.5～4L) 当り 50g	育苗期後半	1回	散布	5回以内 (育苗期は 1回以内、 定植時は 1回以内、 定植後は 3回以内)
		1g/株	定植時		植穴処理土 壌混和	
レタス	ハモグリバエ	10g/培土L	は種時	1回	育苗培土混 和	4回以内 (定植時までの 処理は 1回以内、 定植後は 3回以内)
		0.5～1g/株			株元処理	
	アブラムシ類	セル成型育苗トレイ1箱 または ペーパーポット1冊 (30×60cm、使用土壌 約1.5～4L) 当り 50g	育苗期後半	1回	散布	4回以内 (定植時までの 処理は 1回以内、 定植後は 3回以内)
		1g/株	定植時		植穴処理 土壌混和	
トマト ミニトマト	アブラムシ類 コジラミ類	5g/培土L	は種時又は 鉢上げ時	1回	育苗培土混 和	4回以内 (定植時までの 処理は 1回以内、 定植後は 3回以内)
		1～2g/株	育苗期		株元処理	
	アブラムシ類 コジラミ類 ハモグリバエ類	セル成型育苗トレイ1箱 または ペーパーポット1冊 (30×60cm、使用土壌 約1.5～4L) 当り 50g	育苗期後半		散布	
	アブラムシ類 コジラミ類	1～2g/株	定植時		植穴処理 土壌混和	
きゅうり	アザミヤカ類 アブラムシ類 コジラミ類	5g/培土L	は種時 鉢上げ時	1回	育苗培土混 和	4回以内 (定植時までの 処理は 1回以内、 定植後は 3回以内)
	アブラムシ類 コジラミ類	1g/株	育苗期		株元処理	
	アザミヤカ類 アブラムシ類 コジラミ類	1～2g/株	定植時		植穴処理 土壌混和	

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ニテンピラムを含む農薬の総使用回数
ねぎ	ネギアザミウマ	6kg/10a	は種時	1回	作条処理土壌混和	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後は3回以内)
		セル成型育苗トレイ1箱 または ペーパーポット1冊 (30×60cm、使用土壌約3~4L) 当り 50g	定植当日		散布	
	クロハネギ/コハエ類 ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	6kg/10a	定植時	3回以内	植溝処理土壌混和	
			収穫前日まで		株元処理	
	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	5g/培土L	は種時	育苗培土混和		
ピーマン	アブラムシ類 コジラミ類	1g/株	育苗期	株元処理		
ししとう	アブラムシ類 コジラミ類	1g/株	育苗期	株元処理		
	アブラムシ類 ミナキイロアザミウマ	1~2g/株	定植時	植穴処理土壌混和		
とうがらし類 (ししとうを除く)	アブラムシ類 コジラミ類	1g/株	育苗期	株元処理		
すいか メロン	アブラムシ類 コジラミ類	1g/株	育苗期	1回	株元処理	
	アブラムシ類 コジラミ類 ミナキイロアザミウマ	1~2g/株	定植時	植穴処理土壌混和		
なす	アブラムシ類	5g/培土L	は種時又は 鉢上げ時	1回	育苗培土混和	
	アブラムシ類 コジラミ類	1g/株	育苗期		株元処理	
		セル成型育苗トレイ1箱 または ペーパーポット1冊 (30×60cm、使用土壌約1.5~4L) 当り 50g	育苗期後半	散布		
	アブラムシ類 コジラミ類 ミナキイロアザミウマ	1~2g/株	定植時	植穴処理土壌混和		
食用ぎく	アブラムシ類 マメハモグリバエ ミナキイロアザミウマ	2g/株	収穫前日まで	2回以内	生育期 株元散布	
			3回以内		生育期 株元散布	

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。