

## 適用拡大登録

区 分	殺 虫 剤
農 薬 名	協友ダントツ粒剤
種 類 名	クロチアニジン粒剤
登 録 番 号	第 21645 号
登 録 日	令和 3 年 2 月 10 日

## 登録内容

- ・作物名「あずき」を追加する。
- ・作物名「えだまめ」を追加する。
- ・作物名「レタス」に使用方法「植穴処理土壌混和」を追加する。
- ・作物名「レタス」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「3回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内）」を「5回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内）」に変更する。
- ・作物名「非結球レタス」に使用方法「セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する」を追加する。
- ・作物名「非結球レタス」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「3回以内（育苗期の株元処理は1回以内、散布は2回以内）」を「5回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内）」に変更する。
- ・作物名「みずな」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「3回以内」を「4回以内（は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内）」に変更する。
- ・作物名「はくさい」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「3回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内）」を「5回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内）」に変更する。

別紙

## 【変更内容】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クチアジンを 含む 農薬の 総使用回数	
あずき	アブラムシ類	6kg/10a	は種時	1回	播溝処理 土壌混和	4回以内 (は種時の処理は 1回以内、 は種後は3回以内)	
えだまめ			定植時				
レタス		2g/株	育苗期 後半		セル成型育苗トレイ または ペーパーポットの 上から 散布する	植穴処理 土壌混和	5回以内 (定植時までの処理は 1回以内、 定植後の散布は 2回以内、 定植後の株元散布は 2回以内)
		0.5g/株				株元処理	
非結球レタス		セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (30×60cm、 使用土壌 約1.5~4L) 当り50g	0.5g/株		株元処理		
		0.5g/株					
みずな		6kg/10a	は種時	播溝処理 土壌混和	4回以内 (は種時の土壌混和は 1回以内、 散布は3回以内)		
はくさい	アブラムシ類 ハイマダラノメカイ	0.25g/株	は種時	覆土後 セル成型育苗トレイ または ペーパーポットの 上から散布する	5回以内 (定植時までの処理は 1回以内、 定植後の散布は 2回以内、 定植後の株元散布は 2回以内)		
	コカガ アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメカイ ネキリムシ類	0.5g/株	育苗期 後半	株元処理			
	アブラムシ類 ハイマダラノメカイ	1~2g/株	定植時	植穴処理 土壌混和			
	コカガ アオムシ	2g/株					

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。