

適用拡大登録

区 分	殺虫殺菌剤
農 薬 名	スタウトパディートDX箱粒剤
種 類 名	クロチアニジン・シアントラニリプロール・イソチアニル粒剤
登 録 番 号	第 23773 号
登 録 日	平成 30 年 4 月 11 日

登録内容

- ・適用病害虫名「苗立枯細菌病、苗腐敗症（もみ枯細菌病菌）」を使用時期「は種前、は種時（覆土前）」に追加する。
- ・適用病害虫名「ツマグロヨコバイ」を使用時期「は種前」に追加する。
- ・適用病害虫名「穂枯れ（ごま葉枯病菌）」の使用時期を「は種時（覆土前）～移植当日」に変更する。
- ・適用病害虫名「イナゴ類」を使用時期「移植 3 日前～移植当日」に追加する。

別紙

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 イネズゾウムシ イネト [®] ロイムシ ウカ類 ツマグロヨコバイ イネトムシ フタヒコヤガ ニカメイチユ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	は種前	1回	育苗箱の床土 又は覆土に 均一に混和する
	穂枯れ (ごま葉枯病菌)		は種時 (覆土前)～ 移植当日		育苗箱の上から 均一に散布する
	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病		は種前		育苗箱の床土 又は覆土に 均一に混和する
			は種時 (覆土前)		育苗箱の上から 均一に散布する
	付ゴ [®] 類		移植3日前～ 移植当日		

クオアエジンを含む 農薬の総使用回数	シアントレニブ [®] ロールを含む 農薬の総使用回数	イチアニルを含む 農薬の総使用回数
4回以内 (移植時までの処理は 1回以内、 本田での散布、空中散布、 無人ヘリ散布は合計3回以内)	1回	3回以内 (移植時までの処理は 1回以内、 本田では2回以内)

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。