

適用拡大登録

区 分	殺 虫 剤
農 薬 名	協友ベストガード粒剤
種 類 名	ニテンピラム粒剤
登 録 番 号	第 21609 号
登 録 日	平成 30 年 10 月 10 日

登録内容

- ・作物名「ブロッコリー」に使用方法「植穴処理土壌混和」を追加し、ニテンピラムを含む農薬の総使用回数「4回以内（育苗期の散布は1回以内、水溶剤の散布は3回以内）」を「5回以内（育苗期の散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、水溶剤の散布は3回以内）」に変更する。
- ・作物名「なす」の使用方法「散布」に適用病害虫名「コナジラミ類」を追加する。
- ・作物名「きゅうり」の使用時期「は種時」に適用病害虫名「アブラムシ類」および「アザミウマ類」を追加する。
- ・作物名「きゅうり」の適用病害虫名「ミナミキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ニテンピラムを含む農薬の総使用回数
ブロッコリー	アブラムシ類 アザミヤカ類	セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (30×60cm、使用 土壌約1.5～4L) 当り 50g	育苗期後半	1回	散布	5回以内 (育苗期の散布は 1回以内、 定植時の土壌混和 は1回以内、 水溶剤の散布は 3回以内)
		1g/株	定植時		植穴処理 土壌混和	
なす	アブラムシ類	5g/培土L	は種時又は 鉢上げ時	1回	育苗培土混和	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 株元散布及び 水溶剤の散布は 合計3回以内)
	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株	育苗期		株元処理	
	アブラムシ類 コナジラミ類	セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (30×60cm、使用 土壌約1.5～4L) 当り 50g	育苗期後半		散布	
	アブラムシ類 コナジラミ類 ミナキイロアザミヤカ	1～2g/株	定植時		植穴処理 土壌混和	
	アブラムシ類	2g/株	収穫前日 まで		3回以内	
きゅうり	コナジラミ類 アブラムシ類 アザミヤカ類	5g/培土L	は種時	1回	育苗培土混和	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 水溶剤の散布は 3回以内)
	アブラムシ類		鉢上げ時			
	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株	育苗期		株元処理	
	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミヤカ類	1～2g/株	定植時		植穴処理 土壌混和	

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。