

殺虫殺菌剤  
スタウトパディート箱粒剤  
シアントラニプロール・イソチアニル粒剤

平成30年10月24日付けで以下の適用拡大が登録されました。

## 【変更内容】

- ・作物名「稲（箱育苗）」の適用病害虫名「イネヒメハモグリバエ」の使用時期「移植3日前～移植当日」を「は種時（覆土前）～移植当日」に変更し、使用時期「は種前」を追加する。

## 【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 イネミヅウムシ イトトリス フタヒコバ ニカメテウ ツメグロコバ イトトリス コブノメイガ イコ類 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 内穎糸変病 イネヒメグリバエ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	は種前	1回	育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。	1回	3回以内 (移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)
	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病		は種時 (覆土前) ～移植当日		育苗箱の上から均一に散布する。		
			は種前		育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。		
			は種時 (覆土前)		育苗箱の上から均一に散布する。		
ヒメヒウカ	移植3日前 ～移植当日	育苗箱の上から均一に散布する。					

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社