

適用拡大登録

区 分	殺 菌 剤
農 薬 名	協友ベフラン液剤 25
種 類 名	イミノクタジン酢酸塩液剤
登 録 番 号	第 21653 号
登 録 日	平成 30 年 12 月 5 日

登録内容

<適用病害虫名の追加>

作物名「麦類(小麦を除く)」及び「小麦」に適用病害虫名「なまぐさ黒穂病」(原液/乾燥種子 1kg 当り 3~5mL/種子吹き付け処理又は塗沫処理)を追加する。

<総使用回数の変更>

作物名「小麦」のイミノクタジンを含む農薬の総使用回数を「4 回以内(種子への処理は 1 回以内、散布及び無人航空機散布は合計 3 回以内、出穂期以降は 1 回以内)」に変更する。

【変更内容】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	イミノクタジンを含 む農薬の 総使用回数
麦類 (小麦を 除く)	雪腐大粒菌核病 紅色雪腐病	1000 倍	60~150L/10a	根雪前	2 回以内	散布	3 回以内 (種子への 処理は 1 回以内、 散布は 2 回以内)
	紅色雪腐病	10 倍	乾燥種子 1kg 当り 30~50mL	は種前	1 回	塗沫処理	
		5 倍	乾燥種子 1kg 当り 15~25mL				
	紅色雪腐病 条斑病 斑葉病 網斑病 ふ枯病 なまぐさ黒穂病	原液	乾燥種子 1kg 当り 3~5mL			種子吹き付け 処理又は 塗沫処理	
	斑葉病	250~ 500 倍	-			10~30 分間 種子浸漬	
	なまぐさ黒穂病	1000~ 2000 倍	-				

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ミクダゾンを 含む農薬の 総使用回数
小麦	紅色雪腐病	250 倍	25L/10a	根雪前	3 回以内 (但し、 出穂期 以降は 1 回以内)	散布	4 回以内 (種子への 処理は 1 回以内、 散布及び 無人航空機散布 は合計 3 回以内、 出穂期以降は 1 回以内)
	雪腐大粒菌核病 紅色雪腐病	1000 倍	60~150L/10a				
	うどんこ病 葉枯症			1000~ 2000 倍			
	赤かび病						
	紅色雪腐病	10 倍		乾燥種子 1kg 当り 30~50mL	は種前	1 回	
		5 倍	乾燥種子 1kg 当り 15~25mL				
	紅色雪腐病 条斑病 ふ枯病 なまぐさ黒穂病	原液	乾燥種子 1kg 当り 3~5mL	種子吹き付け 処理又は 塗沫処理			
	なまぐさ黒穂病	1000~ 2000 倍	—	10~30 分間 種子浸漬			

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。