

適用拡大登録

区 分	殺虫殺菌剤
農 薬 名	スタウトパディートDX箱粒剤
種 類 名	クロチアニジン・シアントラニリプロール・イソチアニル粒剤
登 録 番 号	第 23773 号
登 録 日	令和 3 年 10 月 27 日

登録内容

- ・作物名「稲（箱育苗）」の使用方法「育苗箱の上から均一に散布する」に使用量「高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約 5L)1 箱当り 50～100g)」を追加する。

【変更後】(変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	シアントラニリブ [®] ロールを含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 イネスズメムシ イネトモムシ ウカ類 ツマグロヨコバイ イネトムシ フタヒコヤカ ニカメテユウ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	は種前	1回	育苗箱の床土 又は覆土に 均一に混和する	4回以内 (移植時までの 処理は 1回以内、 本田での散布、 空中散布、 無人航空機散 布は合計3回 以内)	1回	3回以内 (移植時までの 処理は 1回以内、 本田では 2回以内)
	穂枯れ (ごま葉枯病菌)	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	は種時 (覆土前)～ 移植当日		育苗箱の上から 均一に散布する			
		高密度には種す る場合は 1kg/10a(育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L)1 箱当り50～ 100g)						
	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	は種前		育苗箱の床土 又は覆土に 均一に混和する			
竹コ類	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	高密度には種す る場合は 1kg/10a(育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L)1 箱当り50～ 100g)	は種時 (覆土前)	育苗箱の上から 均一に散布する				
	移植3日前～ 移植当日							

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。