

適用拡大登録

区 分	殺菌剤
農薬名	カーニバル水和剤
種類名	ジメトモルフ・TPN水和剤
登録番号	第 24227 号
登録日	令和 2 年 11 月 11 日

登録内容

- ・作物名「キャベツ」を追加する。
- ・作物名「ばれいしょ」に適用病害虫名「夏疫病」を追加する。
- ・作物名「なす」に適用病害虫名「すすかび病」を追加する。
- ・作物名「ミニトマト」に適用病害虫名「斑点病」を追加する。
- ・作物名「きゅうり」に適用病害虫名「べと病」を追加する。
- ・作物名「かぼちゃ」に適用病害虫名「べと病」を追加する。
- ・作物名「ねぎ」に適用病害虫名「黒斑病」、「べと病」を追加する。

【変更内容】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメトルフを含む農薬の総使用回数	TPN を含む農薬の総使用回数
ばいしょ	疫病 夏疫病	1000 倍	100 ～ 300L /10a	収穫 14 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内	5 回以内
なす	うどんこ病 すすかび病	1500 倍		収穫 7 日前 まで				4 回以内
ミニトマト	疫病 灰色かび病 葉かび病 うどんこ病 斑点病	1000 倍		収穫前日 まで	2 回以内			2 回以内
きゅうり	炭疽病 うどんこ病 褐斑病 べと病				3 回以内			10 回以内 (土壌灌注は 2 回 以内、散布及び常 温煙霧及び くん煙及びエア ゾル剤の噴射は 合計 8 回以内)
かぼちゃ	うどんこ病 べと病							
キャベツ	べと病	1000 倍		収穫 14 日前 まで	2 回以内			3 回以内 (は種又は定植前 の土壌混和は 1 回以内、散布 及びエアゾル剤 の噴射は合計 2 回以内)
ねぎ	さび病 黒斑病 べと病				3 回以内			4 回以内 (土壌灌注は 1 回 以内、散布は 3 回以内)

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。