

殺虫殺菌剤
スタウトダントツ箱粒剤
クロチアニジン・イソチアニル粒剤

平成31年2月27日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「稲」を追加する。
- ・作物名「稲(箱育苗)」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内)」を「4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)」に変更する。
- ・作物名「湛水直播水稻」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「4回以内(は種時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内)」を「4回以内(は種時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)」に変更する。

次頁へ続く

前頁より続く

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	加アジソンを含む農薬の総使用回数	イファニルを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	は種前	1回	育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。	4回以内 (移植時までの処理は1回以内、 本田での散布、 空中散布、 無人航空機散布は 合計3回以内)	3回以内 (移植時までの処理は1回以内、 本田では2回以内)
	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 内穎褐変病 イネズグムシ イネトイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ フタトゲカヤクサ コメテユウ イヒカサガリバエ		は種時 (覆土前) ～ 移植当日		育苗箱の上から均一に散布する。		
	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病		は種時 (覆土前)				
稲	いもち病 イネズグムシ	1kg/10a	移植時		側条施用	4回以内 (直播での種時又は移植時までの処理は1回以内、 本田での散布、 空中散布、 無人航空機散布は 合計3回以内)	3回以内 (直播での種時又は移植時までの処理は1回以内、 本田では2回以内)
湛水直播水稻	いもち病 イネズグムシ イネトイムシ	1kg/10a	は種時		は種同時 施薬機を用いて 土中施用する。	4回以内 (は種時までの処理は1回以内、 本田での散布、 空中散布、 無人航空機散布は 合計3回以内)	3回以内 (は種時までの処理は1回以内、 本田では2回以内)

使用上の注意事項の変更

- ・「側条施用する場合は、粒剤が均一に散布できる施用装置を装着した田植機を使用すること。」を追加する。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社