

適用拡大登録

区 分	除草剤
農 薬 名	協友バサグラン液剤 (ナトリウム塩)
種 類 名	ベンタゾン液剤
登 録 番 号	第 23599 号
登 録 日	令和 3 年 1 月 13 日

登録内容

- ・作物名「たまねぎ(春播移植栽培)、たまねぎ(秋播移植栽培)、らっきょう、いんげんまめ、えんどうまめ、実えんどう、さやえんどう、とうもろこし、飼料用とうもろこし、ソルガム、麦類(小麦を除く)、小麦、はとむぎ、せり」の使用方法を「雑草茎葉散布又は全面散布」に変更する。
- ・適用地帯の欄を削除する。
- ・作物名「たまねぎ(春播移植栽培)」及び「たまねぎ(秋播移植栽培)」を「たまねぎ」に変更し、「たまねぎ」の使用時期を「春播栽培の移植後 6 月上旬まで(雑草の 3~4 葉期)但し 収穫 30 日前まで」及び「秋播栽培の移植後生葉 4 葉期まで(雑草の 3~4 葉期)但し 収穫 30 日前まで)」とする。
- ・作物名「移植水稻」及び「直播水稻」の適用雑草名「水田一年生雑草 (イネ科を除く)」を「一年生雑草 (イネ科を除く)」に変更する。

【変更後】

7. 適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用 方法	ベンタゾン を含む 農薬の総 使用回数				
			薬量	希釈水量							
たまねぎ	一年生 雑草 (イネ科 を除く)	春播栽培の移植後6月上旬 まで(雑草の3~4葉期) 但し 収穫30日前まで	60~120 mL/10a	70~100 L/10a	1 回	雑草 茎葉 散布 又は 全面 散布	1 回				
		秋播栽培の移植後生葉4葉 期まで(雑草の3~4葉期) 但し 収穫30日前まで									
らっきょう		出芽後 (雑草の3~6葉期) 但し 収穫60日前まで	100~200 mL/10a								
いんげんまめ		初生葉展開期~ 本葉抽出始期 (雑草の2~3葉期)	50~70 mL/10a								
えんどうまめ		3~6葉期 (雑草の3~6葉期) 但し 収穫70日前まで	100~200 mL/10a								
実えんどう さやえんどう		3~6葉期 (雑草の3~6葉期) 但し 収穫40日前まで	100~200 mL/10a								
とうもろこし 飼料用とうもろこし		生育期 (雑草の3~6葉期) 但し 収穫50日前まで	100~150 mL/10a								
ソルガム		生育期 (雑草の3~6葉期) 但し 収穫 30 日前まで	100~200 mL/10a								
麦類 (小麦を除く)		生育期 (雑草の3~6葉期) 但し 収穫90日前まで	100~200 mL/10a								
小麦		生育期 (雑草の3~6葉期)	150 mL/10a								
はとむぎ		但し 収穫45日前まで						2 回 以内	2 回以内		
せり		親株養成期 植付45~60日後まで	200 mL/10a					100 L/10a	1 回	1 回	
べにばないんげん		生育期 (雑草の生育初期~6葉期) 但し 収穫45日前まで	100~200 mL/10a					70~100 L/10a	1 回	畦間雑 草茎葉 散布	1 回

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用 方法	ベンゾリン を含む 農薬の総 使用回数
			薬量	希釈 水量			
移植水稻	一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ オモダカ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ コウキヤガラ エゾノサヤヌカグサ シズイ クサネム	移植後15～55日 但し 収穫50日前まで	500～ 700 mL/10a	70～ 100 L/10a	2回 以内	落水 散布 又は ごく 浅く 湛水 して 散布	2回以内
直播水稻	一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ オモダカ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ	は種後35～50日 但し 収穫50日前まで					

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。