

## 適用拡大登録

区 分	殺虫殺菌剤
農 薬 名	スタウトパディートDX箱粒剤
種 類 名	クロチアニジン・シアントラニリプロール・イソチアニル粒剤
登 録 番 号	第 23773 号
登 録 日	令和 2 年 10 月 28 日

## 登録内容

- ・作物名「稲」（イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ）を追加する。
- ・作物名「稲（箱育苗）」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数を「4 回以内（移植時までの処理は 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計 3 回以内）」から「4 回以内（移植時までの処理は 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計 3 回以内）」に変更する。

別紙

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 イネズソウムシ イネトオイムシ ウカ類 ツマグロヨコバイ イネツムシ フタホシコガ コメテユ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 50g	は種前	1回	育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する	4回以内 (移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)	1回	3回以内 (移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)
	穂枯れ (ごま葉枯病菌)		は種時 (覆土前)～ 移植当日		育苗箱の上から均一に散布する			
	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病		は種前		育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する			
	イナゴ類		は種時 (覆土前) 移植3日前～ 移植当日		育苗箱の上から均一に散布する			
稲	イネズソウムシ イネトオイムシ	1kg/10a	移植時		側条施用	4回以内 (直播での は種時又は 移植時までの 処理は1回 以内、 本田での 散布、 空中散布、 無人航空機 散布は 合計3回以内)		3回以内 (直播での は種時又は 移植時までの 処理は 1回以内、 本田では 2回以内)

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。