

適用拡大登録

区 分	殺菌剤
農 薬 名	協友トップジンM水和剤
種 類 名	チオファネートメチル水和剤
登 録 番 号	第 23108 号
登 録 日	令和 2 年 12 月 9 日

登録内容

- ・作物名「花き類・観葉植物」を「花き類・観葉植物（トルコギキョウを除く）」と「トルコギキョウ」に分離し、「トルコギキョウ」に適用病害虫名「斑点病」を追加する。
- ・作物名「キャベツ」に適用病害虫名「株腐病」（1000 倍、散布）を追加する。
- ・作物名「はくさい」に適用病害虫名「炭疽病」（1500 倍、散布）を追加する。
- ・作物名「かんきつ（みかんを除く）」のチオファネートメチルを含む農薬の総使用回数を「8 回以内（塗布は 3 回以内、散布及び無人航空機散布は合計 5 回以内）」に変更する。

【変更内容】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数
かんきつ (みかんを除く)	貯蔵病害(軸腐病) 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	2000～ 3000 倍	200～ 700L/10a	収穫前日 まで	5 回以内	散布	8 回以内 (塗布は 3 回以内、 散布及び無人航空機 散布は合計 5 回以内)
キャベツ	根朽病 株腐病	1000 倍	100～ 300L/10a	収穫 3 日 前まで	2 回以内		3 回以内 (種子への処理 は 1 回以内、 は種後は 2 回以内)
	菌核病	1000～ 1500 倍					
はくさい	白斑病 炭疽病	1500 倍		収穫 7 日 前まで			
花き類・観葉植物 (トルコギキョウを除く)	菌核病	1500 倍	—	5 回以内	5 回以内		
トルコギキョウ	斑点病						

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。