

## 適用拡大登録

区 分	殺虫殺菌剤
農 薬 名	協友デジタルメガフレア箱粒剤
種 類 名	チアメトキサム・ピロキロン粒剤
登 録 番 号	第 24004 号
登 録 日	令和 3 年 10 月 27 日

## 登録内容

- ・作物名「稲（箱育苗）」の使用時期「移植当日」に使用量「高密度には種する場合は 1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約 5L）1 箱当り 50～100g）」を追加する。
- ・作物名「稲（箱育苗）」の使用時期「移植前 3 日～移植当日」に使用量「高密度には種する場合は 1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約 5L）1 箱当り 50～100g）」を追加する。

## 【変更後】（変更する作物のみ抜粋）

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数	ピロキロンを含む農薬の総使用回数
稲（箱育苗）	ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ	育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50 g	移植当日	1 回	育苗箱中の 苗の上から 均一に 散布する	3 回以内 (移植時 までの 処理は 1 回以内、 本田では 2 回以内)	3 回以内 (移植時 までの 処理は 1 回以内、 本田では 2 回以内)
		高密度には種する 場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50～100g)					
	カメシ類 ウカ類 イネスズウムシ イネトヨイムシ いもち病	育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50 g	移植前 3 日～ 移植当日				
		高密度には種する 場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50～100g)					

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。