

適用拡大登録

区 分	殺 虫 剤
農 薬 名	協友ベストガード粒剤
種 類 名	ニテンピラム粒剤
登 録 番 号	第 21609 号
登 録 日	令和元年 7 月 10 日

登録内容

- ・作物名「すいぜんじな」、「トマト」および「ミニトマト」の適用病害虫名「マメハモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更する。
- ・作物名「トマト」および「ミニトマト」の使用時期「育苗期後半」に適用病害虫名「ハモグリバエ類」を追加する。
- ・作物名「きゅうり」の使用時期「鉢上げ時」に適用病害虫名「コナジラミ類」および「アザミウマ類」を追加する。
- ・作物名「ばれいしょ」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ニテンピラムを含む農薬の総使用回数
すいぜんじな	アブラムシ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類	9kg/10a	定植時	1回	植溝処理 土壌混和	2回以内 (定植時の土壌 混和は1回以内、 株元処理は 1回以内)
			収穫3日前 まで		生育期 株元処理	
トマト ミニトマト	アブラムシ類 コナジラミ類	5g/培土L	は種時又は 鉢上げ時	1回	育苗培土 混和	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 水溶剤の散布は 3回以内)
	アブラムシ類	1g/株	育苗期		株元処理	
	コナジラミ類	1~2g/株				
	アブラムシ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類	セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (30×60cm、使用 土壌約1.5~4L) 当り 50g	育苗期後半		散布	
	アブラムシ類 コナジラミ類	1~2g/株	定植時		植穴処理 土壌混和	
	ハモグリバエ類	2g/株				
きゅうり	コナジラミ類 アブラムシ類 アザミウマ類	5g/培土L	は種時 鉢上げ時	1回	育苗培土 混和	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 水溶剤の散布は 3回以内)
	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株	育苗期		株元処理	
	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	1~2g/株	定植時		植穴処理 土壌混和	
ばれいしょ	アブラムシ類	3 kg/10a	植付時	1回	植溝処理 土壌混和	5回以内 (植付時までの 処理は1回以内、 植付後は 4回以内)

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。