

殺虫殺菌剤

箱いり娘粒剤

クロチアニジン・スピネトラム・イソチアニル・フラメトピル粒剤

平成30年11月21日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「湛水直播水稻」に適用病害虫名「ニカメイチュウ」、「フタオビコヤガ」および「イネツトムシ」を追加する。
- ・作物名「湛水直播水稻」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「4回以内（は種時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内）」を「4回以内（は種時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内）」に変更する。
- ・作物名「稲（箱育苗）」の適用病害虫名「疑似紋枯症（赤色菌核病菌）」の使用時期「移植当日」を「移植7日前～移植当日」に変更する。
- ・作物名「稲（箱育苗）」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「4回以内（移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内）」を「4回以内（移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内）」に変更する。

前頁より続く

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	加チンジンを含む農薬の総使用回数	スピボムを含む農薬の総使用回数	イザチルを含む農薬の総使用回数	万トピルを含む農薬の総使用回数
湛水直播水稻	いもち病 紋枯病 イネミズゾウムシ イネトモイシ ニカメイチュウ フタヒコヤガ イネワムシ	1kg/10a	は種時	1回	は種同時 施肥機を用いて 土中施用する。	4回以内 (は種時までの 処理は 1回以内、 本田での散布、 空中散布、 無人航空機 散布は合計 3回以内)	3回以内 (は種時 までの 処理は 1回以内、 本田での 散布は 2回以内)	3回以内 (は種時 までの 処理は 1回以内、 本田では 2回以内)	2回以内 (は種時 までの 処理は 1回以内)
稲 (箱育苗)	いもち病 紋枯病 白葉枯病 もみ枯細菌病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 内稃腐変病 疑似紋枯症 (褐色紋枯病菌) 疑似紋枯症 (赤色菌核病菌) カカ類 ツグロコバエ コブメガ フタヒコヤガ イネミズゾウムシ イネトモイシ イネワムシ ニカメイチュウ イネヒメガ リハエ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	移植7日前 ～移植当日		育苗箱の 上から均 一に散布 する。	4回以内 (移植時までの 処理は 1回以内、 本田での散布、 空中散布、 無人航空機 散布は合計 3回以内)	3回以内 (移植時 までの 処理は 1回以内、 本田での 散布は 2回以内)	3回以内 (移植時 までの 処理は 1回以内、 本田では 2回以内)	2回以内 (育苗箱 散布は 1回以内)

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社