

適用拡大登録

区 分	殺 虫 剤
農 薬 名	協友ダントツ水溶剤
種 類 名	クロチアニジン水溶剤
登 録 番 号	第 21646 号
登 録 日	令和元年 12 月 4 日

登録内容

- ・作物名「かんしょ」を追加する。
- ・作物名「しゅんぎく」に適用病害虫名「ハモグリバエ類」を追加する。
- ・作物名「なす」の適用病害虫名「カメムシ類」の希釈倍数「2000倍」を「2000～4000倍」に変更する。
- ・作物名「かんきつ」の希釈倍数「2000～4000倍」に適用病害虫名「アオバハゴロモ」を追加する。
- ・作物名「りんご」に適用病害虫名「コガネムシ類成虫」を追加する。
- ・作物名「キウイフルーツ」の適用病害虫名「アオバハゴロモ」の希釈倍数「2000倍」を「2000～4000倍」に変更する。

別紙

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	クチアジンを 含む 農薬の 総使用回数	
かんしょ	アブラムシ類	2000～ 4000 倍	100～300 L/10a	収穫 7 日前 まで	2 回 以内	散布	3 回以内 (植付前の 処理は 1 回以内、 植付後は 2 回以内)	
しゅんぎく	アブラムシ類 ハモグリバエ類	2000～ 4000 倍	100～300 L/10a	収穫 3 日前ま で	3 回 以内	散布	4 回以内 (は種時の土壌混和 は 1 回以内、 散布は 3 回以内)	
なす	ミキミアサミウマ ハモグリバエ類 アブラムシ類 コナジラミ類 テントウムシダマシ類 カメシ類	2000～ 4000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (育苗期の株元処理 及び定植時の 土壌混和は 合計 1 回以内、 散布及び定植後の 株元散布は 合計 3 回以内)	
かんきつ	アブラムシ類 ミカンハモグリガ アサミウマ類 ケキスイ類 コアオナムグリ ツノロウムシ コナカイラムシ類 ゴマダラカミキリ カメシ類 アゲハ類 アカマルカイラムシ ナシマルカイラムシ ミカンバエ ミカンキンラムシ コナジラミ類 アオバハゴロモ	2000～ 4000 倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	6 回以内 (樹幹散布は 3 回以内、 散布は 3 回以内)	
	カネタタキ							2000 倍
	ミカンハモグリガ ゴマダラカミキリ							20 倍
	ミカンキンラムシ	40 倍	200mL/樹					
りんご	カメシ類 キンモンホリガ ギンモンハモグリガ シクイムシ類 アブラムシ類 コナカイラムシ類 リンゴワタムシ ケムシ類 コガネムシ類成虫	2000～ 4000 倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回以内	
キウフルーツ	キウ化メヨコバイ カメシ類 アオバハゴロモ	2000～ 4000 倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回以内	

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。