

適用拡大登録

区 分	殺 虫 剤
農 薬 名	協友スミチオン乳剤
種 類 名	ME P 乳剤
登 録 番 号	第 21949 号
登 録 日	平成 30 年 5 月 30 日

登録内容

- ・作物名「稲」の希釈倍数「1000倍」、使用方法「散布」に適用病害虫名「アワヨトウ」を追加する。
- ・作物名「だいず」の希釈倍数「1000倍」に適用病害虫名「マメハンミョウ」を追加する。
- ・作物名「らっきょう」に適用病害虫名「ネダニ類」を追加する。
- ・作物名「らっきょう」の適用病害虫名「アザミウマ類」の使用時期「収穫14日前まで」を「収穫7日前まで」に変更する。
- ・作物名「らっきょう」のME Pを含む農薬の総使用回数「2回以内」を「3回以内（植付前は1回以内、植付後は2回以内）」に変更する。
- ・作物名「稲」、「麦類（大麦、小麦を除く）」、「大麦」、「小麦」、「みかん」、「だいず」の使用方法「無人ヘリコプターによる散布」を「無人航空機による散布」に変更する。

別紙

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
稲	ニカメイト第1世代	1000~2000倍	60~150 L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	3回以内 (種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)
	ニカメイト第2世代	800~1000倍					
	サカメイト第3世代	1000倍					
	ヒメトビウカ						
	カメムシ類						
	イネツトムシ						
	イネシカレセンチュウ						
	イネトコロオムシ						
	アブラムシ類						
	アワヨトウ						
イネモグリハエ	1000~2000倍						
イネメハモグリハエ	2500倍						
フタホビコヤガ	2000~4000倍						
イネシカレセンチュウ	1000倍	100倍	-	は種前	1回	6~72時間浸漬 専用の種子消毒機を用いて 乾燥種籾重量の3%の量の 希釈液を種籾に吹付け処理又は 塗沫処理	
	イネシカレセンチュウ						
ニカメイト ヒメトビウカ カメムシ類 イネモグリハエ イネメハモグリハエ フタホビコヤガ イネツトムシ	30倍	3L/10a	収穫21日前まで	2回以内	空中散布		
	8倍	800mL/10a			無人航空機による散布		
		25L/10a			散布		
麦類 (大麦、小麦を除く)	アブラムシ類 アワヨトウ ムギキキクグリハエ	1000倍	60~150 L/10a	収穫14日前まで	1回	散布	
	ムギアカタマハエ ヒメトビウカ	30倍	3L/10a			空中散布	
	ヒメトビウカ	8倍	800mL/10a			無人航空機による散布	
	アブラムシ類						
大麦	アブラムシ類 アワヨトウ ムギキキクグリハエ	1000倍	60~150 L/10a	収穫7日前まで	1回	散布	
	ムギアカタマハエ ヒメトビウカ	30倍	3L/10a			空中散布	
	ヒメトビウカ	8倍	800mL/10a			無人航空機による散布	
	アブラムシ類						

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
小麦	アブラムシ類	250 倍	25L/10a	収穫7日前まで	1 回	散布	1 回
	アブラムシ類 アヲトウ ムギキモグリハエ	1000 倍	60～150 L/10a				
	ムギアカタマハエ ヒトビウカ	30 倍	3L/10a				
	ヒトビウカ アブラムシ類	8 倍	800mL/10a			無人航空機による散布	
みかん	アブラムシ類	1000～2000倍	200～ 700L/10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内 (樹幹処理は 1回以内)
	ハマキムシ類 サンホセカイガラムシ アザミウマ類 カメムシ類 カネタキ シロツボミタマハエ ケキスイ類 コオハナムグリ フラーハラゾウムシ ミカンキシラミ コナカイガラムシ類	1000倍					
だいず	ケキスイ類 コオハナムグリ アザミウマ類	10倍	5L/10a	収穫21日前まで	4回以内	無人航空機による散布	4回以内
	マメシクイガ ダイズサヤタマハエ シロイチモシマダラメイガ マヒメサヤムシガ カメムシ類	20 倍	3L/10a			空中散布	
	ダイズサヤタマハエ シロイチモシマダラメイガ ダイズサヤムシガ カメムシ類 ウコンノメイガ マメシクイガ	8 倍	800 mL/10a			無人航空機による散布	
	シロイチモシマダラメイガ ダイズサヤタマハエ カメムシ類 マヒメサヤムシガ ウコンノメイガ マメハシヨウ	1000 倍	100～300 L/10a			散布	
	アブラムシ類	1000～2000 倍					
らっきょう	ネダニ類	1000～2000 倍	—	植付前	1 回	30 分間 種球浸漬	3 回以内 (植付前は 1 回以内、 植付後は 2 回以内)
	アザミウマ類	1000 倍	100～300 L/10a	収穫 7 日前 まで	2 回 以内	散布	

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。