

適用拡大登録

区 分	殺 虫 剤
農 薬 名	協友ベストガード水溶剤
種 類 名	ニテンピラム水溶剤
登 録 番 号	第 21610 号
登 録 日	令和元年 7 月 10 日

登録内容

- ・作物名「ばれいしょ」のニテンピラムを含む農薬の総使用回数「4回以内」を「5回以内（植付時までの処理は1回以内、植付後は4回以内）」に変更する。
- ・作物名「かんしょ」に適用病害虫名「アブラムシ類」、希釈倍数「2000倍」を追加する。
- ・作物名「ねぎ」の適用病害虫名「ネギアザミウマ」および「ネギハモグリバエ」の希釈倍数「1000倍」を「1000～2000倍」に変更する。
- ・作物名「トマト」および「ミニトマト」に適用病害虫名「クロバネキノコバエ類」、希釈倍数「2000倍」を追加する。
- ・作物名「なす」に適用病害虫名「カメムシ類」、希釈倍数「1000倍」を追加する。
- ・作物名「とうがらし類」の希釈倍数「1000倍」を「1000～2000倍」に変更する。
- ・作物名「きゅうり」に適用病害虫名「クロバネキノコバエ類」、希釈倍数「2000倍」を追加する。

【変更内容】

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ニテンゾラムを含む農薬の総使用回数		
ばれいしょ	-	アブラムシ類	1000～2000倍	100～300 L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	5回以内 (植付時までの処理は1回以内、植付後は4回以内)		
かんしょ		コジラミ類	1000倍		アブラムシ類	2000倍		育苗期	3回以内	3回以内
		コジラミ類	1000～2000倍							
ねぎ		ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	1000～2000倍		クロハネコバエ類	2000倍		収穫前日まで	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、株元処理及び水溶剤の散布は合計3回以内)
		コジラミ類 アブラムシ類 アザミウマ類	1000～2000倍							
トマト ミニトマト		クロハネコバエ類	2000倍		アブラムシ類 コジラミ類 アザミウマ類	1000～2000倍		収穫前日まで	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、水溶剤の散布は3回以内)
		コジラミ類 アブラムシ類 ミメキイロアザミウマ	1000～2000倍							
なす		カメムシ類	1000倍		アブラムシ類 アザミウマ類	1000～2000倍		収穫前日まで	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、株元散布及び水溶剤の散布は合計3回以内)
		コジラミ類	1000～2000倍							
とうがらし類		コジラミ類	1000～2000倍					収穫前日まで	3回以内	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内)
きゅうり	コジラミ類 アブラムシ類 ミメキイロアザミウマ	1000～2000倍	クロハネコバエ類	2000倍	収穫前日まで	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、水溶剤の散布は3回以内)			
	コジラミ類 アブラムシ類 ミメキイロアザミウマ	1000～2000倍								

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。