

## 新規登録

区 分	殺虫殺菌剤
農 薬 名	稲大将箱粒剤
種 類 名	オキサズスルフィル・イソチアニル・ インピルフルキサム粒剤
登 録 番 号	第 24616 号
登 録 日	令和 4 年 2 月 24 日

新規登録内容

・農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキサズルフィルを含む農薬の総使用回数	イチフェニルを含む農薬の総使用回数	インピルフルキサムを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	苗立枯細菌病 苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌)	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50g	は種時 (覆土前)	1 回	育苗箱の 上から 均一に 散布する	1 回	3 回以内 (移植時まで の処理は 1 回以内、 本田では 2 回以内)	1 回
		高密度に は種する場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50～100g)						
稲 (箱育苗)	イネズヅウムシ イネトコイムシ ウカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイトウ フタホトコヤガ イネツトムシ コブノメガ イコ類 いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 内穎褐変病 紋枯病	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50g	は種時 (覆土前) ～移植当日	1 回	育苗箱の 上から 均一に 散布する	1 回	3 回以内 (移植時まで の処理は 1 回以内、 本田では 2 回以内)	1 回
		高密度に は種する場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50～100g)						
稲	いもち病 紋枯病	1kg/10a	移植時		側条施用		3 回以内 (直播での は種時 又は 移植時まで の処理は 1 回以内、 本田では 2 回以内)	

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。