

適用拡大登録

| | |
|---------|---------------|
| 区 分 | 殺 菌 剤 |
| 農 薬 名 | 協友ベフラン液剤 25 |
| 種 類 名 | イミノクタジン酢酸塩液剤 |
| 登 録 番 号 | 第 21653 号 |
| 登 録 日 | 令和元年 7 月 10 日 |

登録内容

- ・作物名「りんご」に適用病害虫名「うどんこ病」(1000 倍/散布/展葉期)を追加する。
- ・作物名「りんどう」に適用病害虫名「黒斑病」(1500 倍/散布)を追加する。

【変更内容】

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミノクタジンを 含む農薬の 総使用回数 | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------|---|------|--|--------|------------------|---|-------|----|
| りんご | 腐らん病 | 500～ 1000 倍 | 200～ 700L/10a | 休眠期 | 6 回以内 (但し、 開花期以降 散布は 3 回以内) | 散布 | 8 回以内 (液剤及び 水和剤は 合計 6 回以内 (開花期以降は 3 回以内)、 塗布剤は 2 回以内) | | | | | |
| | モリア病 腐らん病 黒星病 うどんこ病 | 1000 倍 | | 展葉期 | | | | | | | | |
| | 黒星病 | 1500 倍 | | 収穫前日 まで | | | | | | | | |
| | 斑点落葉病 褐斑病 輪紋病 すす点病 すす斑病 | 1500～ 2000 倍 | | | | | | | | | | |
| | 紫紋羽病 | 250 倍 | | | | | | - | 苗木 植付前 | - | 根部浸漬 | |
| | りんどう | 花腐菌核病 葉枯病 黒斑病 | | | | | | 1500 倍 | 100～ 700L/10a | - | 8 回以内 | 散布 |

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。