

適用拡大登録

区 分	殺 虫 剤
農 薬 名	協友ベストガード粒剤
種 類 名	ニテンピラム粒剤
登 録 番 号	第 21609 号
登 録 日	令和 2 年 7 月 8 日

登録内容

- ・作物名「ねぎ」の使用時期「定植時」に適用病害虫名「クロバネキノコバエ類」を追加する。
- ・作物名「トマト」および「ミニトマト」の使用時期「育苗期」の適用病害虫名「アブラムシ類」の使用量「1g/株」を「1～2g/株」に変更する。
- ・作物名「ピーマン」の使用時期「定植時」に適用病害虫名「コナジラミ類」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ニテンピラムを含む農薬の総使用回数
ねぎ	ネバハモグリバエ ネバアザミウマ	5g/培土L	は種時	1回	育苗培土混和	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 株元処理及び水溶剤の散布は合計3回以内)
	ネバアザミウマ	6kg/10a			作条処理 土壌混和	
		セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (30×60cm、使用 土壌約3～4L) 当り50g	定植当日		散布	
		クロバネキノコバエ類	6kg/10a		定植時	
	ネバアザミウマ ネバハモグリバエ	収穫前日まで			3回以内	
トマト ミニトマト	アブラムシ類 コナジラミ類	5g/培土L	は種時又は 鉢上げ時	1回	育苗培土混和	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 水溶剤の散布は3回以内)
		1～2g/株	育苗期		株元処理	
	アブラムシ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類	セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (30×60cm、使用 土壌約1.5～4L) 当り50g	育苗期後半		散布	
		アブラムシ類 コナジラミ類	1～2g/株		定植時	
アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株	育苗期	株元処理	4回以内 (育苗期の株元処理 及び定植時の 土壌混和は 合計1回以内、 散布は3回以内)		
ピーマン	アブラムシ類 ミキイロアザミウマ コナジラミ類	1～2g/株	定植時		植穴処理 土壌混和	

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。