

## 水稻除草剤

# アットウ<sup>®</sup> Zジャンボ

テフリルトリオン……………5.0%  
 ビラクロニル……………5.0%  
 プロピリスルフロソ……………2.25%

種類名/テフリルトリオン・ビラクロニル・  
 プロピリスルフロソ粒剤  
 農林水産省登録/第24323号  
 毒性/普通物\*  
 有効年限/3年  
 包装/(40g×10)×10、4kg×1、  
 16kg (受注生産の担い手直送規格)

### 特 長

- 高葉齢のノビエや、SU抵抗性雑草(ホタルイ、コナギ、オモダカ等)に優れた効果を発揮します。
- ビラクロニルとテフリルトリオン配合により、イボクサ・クサネム・ホンバヒメミソハギなど近年問題となる特殊雑草にも効果を発揮します。
- 多年生雑草(クログワイ等)にも高い効果で、長期間抑制します。

### 適用雑草と使用方法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用雑草名	使用時期	10a当り 使用量	総使用回数*	使用方法
移植 水稲	一年生雑草 多年生広葉雑草 アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植後3日～ ノビエ4葉期 但し、 収穫60日前まで	小包装 (バック) 10個 (400g)	本剤 1回 テフリルトリオン剤 2回 ビラクロニル剤 2回 プロピリスルフロソ剤 2回	水田に小包装 (バック)のまま 投げ入れる
直播 水稲	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫60日前まで			

### 使用にあたって

#### ■使用上の注意

- 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきってください。
- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの4葉期までに時期を失ないように使用してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果がフレが出るので、必ず適期に使用するように注意してください。ホタルイは5葉期まで、ヘラオモダカは2葉期まで、ウリカワは5葉期まで、ミズガヤツリは20cmまで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生期まで、オモダカは矢じり葉2葉期まで、クログワイは20cmまで、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは3cmまで、ナガエツルノゲイトウは再生始期、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前が本剤の散布適期です。また、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、ナガエツルノゲイトウは発生期間が長く遅い発生のもまで十分効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。
- 散布に当っては、水の出入りを止め5～6cmの湛水状態に保ってください。本剤散布後、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 本剤は小包装(バック)のまま、10アール当り10個の割合で水田に投げ入れてください。
- バックに使用しているフィルムは水溶性なので、ぬれた手で作業したり、降雨で破袋することがないようにしてください。
- 藻や浮き草が多発している水田では、拡散が不十分となり部分的な被害や効果不足を生じることがあるので使用をさけてください。
- 浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平作業および植え付けはていねいに行ってください。未熟有機物を施用した場合は特にていねいに行ってください。

- 著しい降雨が予想される場合には除草効果が低下するおそれがあるので、散布を控えてください。
- 空袋等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

#### ■薬害

- 軟弱な苗を移植した水田、極端な浅植えをした水田、極端な深水となった水田および砂質土で漏水の大きな水田(減水深2cm/日以上)では、薬害を生じるおそれがあるので使用しないでください。
- 直播水稲栽培では、稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意してください。
- いぐさ栽培予定の水田では使用しないでください。
- 本剤散布後の田面水を他作物に灌水しないでください。

#### ■水産動植物への注意

- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

#### ■安全使用上の注意

- 本剤は水溶性フィルムで小包装化されているため、ぬれた手で触らないでください。
- 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意してください。
  - ①眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
  - ②皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。

#### ■貯蔵上の注意

- 水溶性フィルムは吸湿性があるので、湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を固く閉じて保管してください。また、強く加圧されると水溶性フィルムが劣化するおそれがあるので下積みにならないようにしてください。
- 密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、子供の手のとどかないなるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2024年7月25日現在の登録内容に基づいています。