

殺虫殺菌剤

ST

パダン[®]オリゼメート[®]粒剤

カルタップ塩酸塩……………4.0%
プロベナゾール……………8.0%

種類名／カルタップ・プロベナゾール粒剤
農林水産省登録／第21141号(往友化学登録)
毒性／劇物
有効年限／4年
包装／3kg×8

適用病害虫と使用方法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用病害虫名	10a当り使用量	使用時期	総使用回数*	使用方法
稲	ニカメイチュウ コブノメイガ イネツトムシ いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病	3～4kg	収穫30日前 まで	本剤 2回 カルタップ剤 6回 [浸種前は1回、浸種後から 直播での1回、浸種時は移植時 までの処理は1回] プロベナゾール剤 2回 [移植時までの処理は1回]	散布

使用にあたって

■使用上の注意

- 本剤を使用した場合には、チオシクロムまたはベンズルタップを含む剤は使用しないでください。
- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 予防的に散布した場合に有効です。葉いもち防除の使用適期日は、初発の7～10日前であるので、発生予察情報に注意して時期を失しないように散布してください。穂いもち防除の使用適期は、出穂の3～4週間前です。
- 白葉枯病に対しては、移植後なるべく早い時期に使用の方が有効であるので、移植活着後(移植後7～10日)なるべく早く使用してください。
- 出穂以降の白葉枯病、もみ枯細菌病に対する使用適期は、出穂3～4週間前です。
- 砂質土壌および漏水の大きな水田での使用はさけてください。
- もみ枯細菌病に対しては効果の不十分な場合があるので、もみ枯細菌病のみを対象とすることをさけ、穂いもち病等との同時防除を目的として使用してください。
- 湛水状態(湛水深3～5cm)でまきむらのないように均一に散布し、散布後少なくとも4～5日間はそのまま湛水状態を保ち、田面を露出させたり水を切らしたりしないように注意し、また散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。

■毒



- 蚕に対して長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、桑に付着するおそれのある場所では使用をさけてください。

■水産動植物への注意



- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 水産動植物(甲殻類、ドジョウ)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池等周辺での使用はさけてください。
- 散布後は水管理に注意してください。

■安全使用上の注意

- 医薬用外劇物ですので取扱いには十分注意してください。
- 誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当てを受けてください。
- カルタップによる中毒に対しては動物実験でL-システイン製剤の投与が有効であると報告されています。
- 眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。(刺激性)

- 皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。(弱い刺激性)



- 散布の際は農業用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするともに衣服を交換してください。

- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。



- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物との接触をさけてください。

- 夏期高温時の使用をさけてください。

■貯蔵上の注意

- 密封し、直射日光をさけ、鍵のかかるなるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2024年7月25日現在の登録内容に基づいています。