

殺虫剤

協友

サイアノックス[®]乳剤

CYAP 50.0%

種類名／CYAP乳剤
農林水産省登録／第21807号
毒性／普通物*
有効年限／5年
危険物表示／4-2石
包装／500ml×20

特 長

- 有機リン系殺虫剤です。
- チョウ目害虫および吸汁性害虫であるアブラムシ類等に対し速効的に作用しますが、残効は長くありません。殺卵効果もあります。

適用害虫と使用方法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法	
キャベツ	アオムシ ヨトウムシ(若～中齢幼虫) タマナギンウワバ アブラムシ類	1000～ 1500倍	100～300ℓ	収穫21日前まで	2回	散布	
	コナガ キスジノミハムシ成虫	1000～ 2000倍					
はくさい だいこん	アオムシ ヨトウムシ(若～中齢幼虫) タマナギンウワバ アブラムシ類	1000～ 1500倍		収穫14日前まで			
	コナガ キスジノミハムシ成虫	1000～ 2000倍					
ねぎ	アザミウマ類	500～ 1000倍		収穫21日前まで			
たまねぎ				収穫14日前まで			3回
なす	テントウムシダマシ	1000倍		収穫前日まで			2回
きゅうり	アブラムシ類 アザミウマ類			収穫開始 3日前まで			
	いんげんまめ			マメシンクイガ フキノメイガ インゲンテントウ			
あずき	マメシンクイガ フキノメイガ			収穫21日前まで			
ばら き	アブラムシ類		—	6回			

使用にあたって

■使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。



- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。

- ①ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。
- ②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
- ③関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。

■混用・薬害

- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性薬剤との混用はさけてください。

- はくさいに使用する場合、幼苗期および結球期直前は葉害を生じるおそれがあるのでさけてください。

■蚕 毒

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

■水産動植物への注意

- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

■安全使用上の注意

- 誤飲などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当てを受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けてください。
- 本剤の解毒剤としては、動物実験で硫酸アトロピン製剤およびPAM製剤が有効であると報告されています。



- 原液は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護メガネを着用して薬剤が眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。

- 原液は皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。

- 危険物第四類第二石油類に属するので火気には十分注意してください。



- 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。



- また散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。

- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。

- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

■貯蔵上の注意

- 密栓し、火気をさけ、直射日光のあたらない低温な場所に保管してください。

本資料の記載内容は2024年7月25日現在の登録内容に基づいています。