

園芸・緑地管理用除草剤

協友

ナブ® 乳剤

セトキシジム..... 20.0%

種類名/セトキシジム乳剤
農林水産省登録/第23658号
毒性/普通物*
有効年限/4年
危険物表示/4-2石
包装/500ml×20

特 長

- イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)に優れた殺草効果を発揮します。
- 登録作物にかかっても影響がなく、ほとんどの登録作物に全面散布が可能です。
- 浸透移行性に優れ、根まで枯殺します。
- 散布液が乾けば降雨の影響はほとんどありません。
- 土壌中では極めて短時間で分解されるので、後作物への影響がありません。

適用雑草と使用方法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10a当り使用量		総使用回数*	使用方法
				薬量	希釈水量		
あずき いんげんまめ	—	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで	150~ 200ml	100~ 150ℓ	2回	雑草茎葉散布 又は全面散布
			雑草生育期 イネ科雑草6~8葉期 但し収穫14日前まで	200ml			
えんどうまめ			雑草生育期 イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで	150~ 200ml	通常散布 50~150ℓ 少量散布 25~50ℓ	1回	
			雑草生育期 イネ科雑草6~8葉期 但し収穫30日前まで	200ml			
だいず			雑草生育期 イネ科雑草9~10葉期 但し収穫30日前まで	250~ 300ml	通常散布 50~100ℓ 少量散布 25~50ℓ	1回	
			雑草生育期 イネ科雑草3~5葉期 但し収穫60日前まで	150~ 200ml			
べにばないんげん			雑草生育期 イネ科雑草3~5葉期 但し収穫90日前まで		100~ 150ℓ	1回	
らっかせい			雑草生育期 イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで				
豆類 (未成熟)			雑草生育期 イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで	200ml	100ℓ	1回	
			雑草生育期 イネ科雑草6~8葉期 但し収穫30日前まで				
かんしょ	雑草生育期 イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで	200ml	100ℓ	1回			
	雑草生育期 イネ科雑草6~8葉期 但し収穫30日前まで						

(つづく)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10a当り使用量		総使用回数*	使用方法
				薬量	希釈水量		
さといも	—	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫30日前まで	150～ 200mℓ	100～ 150ℓ	1回	雑草茎葉散布 又は全面散布
ばれいしょ			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫前日まで				
こんにゃく			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫60日前まで	150～ 200mℓ	100～ 150ℓ	1回	
やまのいも			雑草生育期 イネ科雑草6～8葉期 但し収穫60日前まで				
やまのいも (むかご)			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫14日前まで	200mℓ	100ℓ		
キャベツ だいこん はくさい			雑草生育期 イネ科雑草6～8葉期 但し収穫14日前まで			150～ 200mℓ	
かぶ カリフラワー 非結球あぶ らな科葉菜類			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫7日前まで	200mℓ	100ℓ		
ブロッコリー			雑草生育期 イネ科雑草6～8葉期 但し収穫7日前まで			150～ 200mℓ	
すいか かぼちゃ トマ			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫14日前まで	200mℓ	100ℓ		
いちご			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫開始14日前ま で			150～ 200mℓ	
にんじん			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫14日前まで	200mℓ	1回		
セルリー			雑草生育期 イネ科雑草6～8葉期 但し収穫14日前まで			150～ 200mℓ	
ごぼう			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫30日前まで	200mℓ	100ℓ		
			雑草生育期 イネ科雑草6～8葉期 但し収穫30日前まで				

(つづく)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10a当り使用量		総使用回数*	使用方法	
				薬量	希釈水量			
にんにく	—	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫7日前まで	150～ 200ml	100～ 150ℓ	1回	雑草茎葉散布 又は全面散布	
ねぎ			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫30日前まで		100ℓ			
			たまねぎ	雑草生育期 イネ科雑草6～8葉期 但し収穫30日前まで	200ml			100～ 150ℓ
もりあざみ				雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫14日前まで	150～ 200ml			
			しょうが	雑草生育期 イネ科雑草6～8葉期 但し収穫14日前まで	200ml	150～ 200ml		1回
ほうれんそう レタス				雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫7日前まで	150ml			
			アスパラガス	雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫前日まで	150～ 200ml	200ml		100ℓ
にら				雑草生育期 イネ科雑草6～8葉期 但し収穫前日まで	150ml			
			チコリ	雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫前日まで	150～ 200ml	150～ 200ml		100～ 150ℓ
チコリ (根株)				根株養成期の 雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し根株揃上30日前まで	150～ 200ml			
			てんさい	雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫30日前まで	150～ 300ml (0.3～0.6 ml/ペーパー ポット6冊)	150ℓ (300ml/ ペーパー ポット6冊)		2回
育苗期の雑草生育期 イネ科雑草1～3葉期 但し収穫30日前まで				200ml	100ℓ			
雑草生育期 イネ科雑草6～8葉期 但し収穫30日前まで				150～ 200ml	通常散布 50～150ℓ 少量散布 25～50ℓ			
キノア			レッドトップ シバムギ	雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫30日前まで	300～ 400ml	100～ 150ℓ		2回
			一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草3～6葉期 但し収穫14日前まで	150～ 200ml	100ℓ		


作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10a当り使用量		総使用回数*	使用方法	
				薬量	希釈水量			
そば	—	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ピラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫30日前まで	150～ 200ml	通常散布 50～150ℓ 少量散布 25～50ℓ	1回	雑草茎葉散布 又は全面散布	
雑草生育期 イネ科雑草6～8葉期 但し収穫30日前まで			200ml					
食用ゆり			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫30日前まで	150～ 200ml	100～ 150ℓ	2回		
なたね			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫60日前まで					1回
とりかぶと (薬用)			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫14日前まで			2回		
とうき			雑草生育期 イネ科雑草3～6葉期 但し収穫14日前まで					
はっか			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫14日前まで			100ℓ		
みしまさいこ			雑草生育期 イネ科雑草3～6葉期 但し収穫30日前まで			100～ 150ℓ		4回 (1年間に2回)
おうぎ			雑草生育期 イネ科雑草3～6葉期			1回		
おけら			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫30日前まで			100ℓ		2回
しゃくやく (薬用)			雑草生育期 イネ科雑草3～6葉期 但し収穫60日前まで			10回 (1年間に2回)		
せんきゅう			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫75日前まで					
ぎぼうし			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫75日前まで	100～ 150ℓ	2回	雑草茎葉散布		
せり			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し収穫60日前まで					
いぐさ			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期	3回	雑草茎葉散布 又は全面散布			
桑			雑草生育期 草丈20～30cm			200～ 250ml		150～ 200ℓ
たばこ			雑草生育期 但し植付10日前まで、 または植付後 10日から大土寄期まで	150～ 200ml	100～ 150ℓ	1回		雑草茎葉 畦面散布
わた			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期			3回		雑草茎葉散布 又は全面散布
きく			雑草生育期 イネ科雑草3～6葉期					
りんどう			雑草生育期 イネ科雑草3～6葉期					

(つづく)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10a当り使用量		総使用回数*	使用方法
				薬量	希釈水量		
樹木類	—	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期	150～ 200mℓ	100ℓ	3回	雑草茎葉散布 又は全面散布
すぎ (床替床) ひのき (床替床)				100～ 150ℓ			
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 路 運動場 宅地等	ススキ チガヤ	雑草生育期 (草丈40cm)	150～ 400mℓ	100～ 200ℓ		植栽地を除く 樹木等の周辺 地に雑草茎葉 散布
				500～ 1000mℓ	150～ 200ℓ		植栽地を除く 樹木等の周辺 地に局所散布

使用にあたって

■使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 雑草茎葉にかかるよう、まきむらのないように均一に散布してください。
- 広葉雑草およびカヤツリグサ科には効果が期待できないので、イネ科雑草優占圃場で使用してください。なお広葉雑草などが混在する場合は、これらの雑草に有効な除草剤との体系で使用してください。
- 遅効的であり、イネ科雑草を完全に枯殺するまでに7～10日を要するので、誤ってまき直しなどしないように注意してください。
- そば、だいずおよびてんさいについて、10アール当りの使用液量を25～50ℓで散布する場合、少量散布に適合したノズルを使用してください。
- 冬期の低温期や出穂期以降など、雑草の生育が停止している場合には、効果が劣ることがあるので使用をさけてください。
- 公園、堤とう等で使用する場合、特に以下のことに注意してください。
 - ①激しい降雨の予想される場合は使用をさけてください。
 - ②散布薬液の飛散、あるいは本剤の流出によって有用植物に薬害が生じることのないよう十分注意して散布してください。
 - ③水源地、養魚池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意してください。
- 本剤は自動車などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意してください。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意してください。特に適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合には、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。


■薬害

- イネ科作物には薬害があるので、周囲にイネ科作物がある場合は、薬液が飛散しないように注意してください。

■水産動植物への注意

- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので養殖池等周辺での使用はさけてください。

■安全使用上の注意

- 通常の使用方法では危険性は低いですが、誤飲などのないように注意してください。
- 原液は皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないように注意してください。万一付着した場合には石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して散布液を吸い込んだり、浴びたりしないよう注意してください。作業後は手足、顔など皮膚の露出部を石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 散布器具、容器の洗浄水および残りの薬液は河川等に流さず、容器は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。

- 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中および散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
 - 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。
 - 危険物第四類第二石油類に属するので、火気には十分注意してください。
- 貯蔵上の注意**
- 密栓し、火気をさけ、直射日光が当たらない低温な場所に保管してください。

本資料の記載内容は2024年7月25日現在の登録内容に基づいています。