

## 殺菌剤

# フジワン<sup>®</sup>乳剤

イソプロチオラン…………… 40.0%

種類名/イソプロチオラン乳剤  
農林水産省登録/第13277号(日本農薬登録)  
毒性/普通物\*  
有効年限/5年  
危険物表示/4-2石  
包装/500ml×20

## 特 長

- 浸透移行性に優れ、いもち病に対して安定した効果が長期間持続するとともに、稲こうじ病を同時防除できます。
- 穂ばらみ期から穂揃い期の散布で稲の登熟歩合向上効果を発揮します。
- 無人ヘリコプターでの散布にも使用できます。

## 適用病害と使用方法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用病害名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
稲	いもち病 稲こうじ病	1000倍	60～150ℓ	収穫14日前 まで	本剤 2回 イソプロチオラン剤 3回 [移植前は1回、 本田では2回]	散布
		300倍	25ℓ			
		30倍	3ℓ			空中散布
		8倍	800ml			無人航空機散布
きく	白さび病	1000倍	100～300ℓ	発病初期	本剤 5回 イソプロチオラン剤 5回 [浸漬は1回]	散布

作物名	使用目的	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
稲	登熟歩合向上	1000倍	150ℓ	穂ばらみ期 ～穂揃い期 但し、収穫 14日前まで	本剤 2回 イソプロチオラン剤 3回 [移植前は1回、 本田では2回]	散布

## 使用にあたって

### ■使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤はいもち病発生に際して予防的に散布した方がより効果的です。
- 葉いもちに対しては、発生が予想される場合、または初発生を見たら直ちに散布してください。
- 本剤を本田の水稻に対して希釈倍数300倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。
- 空中散布、無人航空機散布に関する注意については「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機(無人ヘリコプター等)散布・滴下に関する注意」をご参照ください。
- 散布薬液の飛散によって自動車の塗装等に被害を生じるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

### ■混 用

- アルカリ性薬剤との混用はさけてください。
- 特定の農薬(混用可能が確認されているもの)を除いて、原則として他の農薬との混用は行わないでください。

### ■蚕 毒

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

### ■水産動植物への注意

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 空中散布および無人航空機による散布で使用する場合は、河川、養殖池等に飛散しないよう特に注意してください。

### ■安全使用上の注意

- 誤飲などのないように注意してください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。



- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 危険物第四類第二石油類に属するので火気には十分注意してください。

### ■貯蔵上の注意

- 密栓し、火気をさけ、直射日光のあたらない低温な場所に保管してください。

本資料の記載内容は2024年7月25日現在の登録内容に基づいています。