

殺虫殺菌剤

アレス® モンガレス® 箱粒剤

オキサズルフィル……………2.0%  
 インビルフルキサム……………2.0%

種類名／オキサズルフィル・  
 インビルフルキサム粒剤  
 農林水産省登録／第24614号(住友化学登録)  
 毒性／普通物\*  
 有効年限／5年  
 包装／1kg×12

特 長

- 1つの殺虫成分で幅広い害虫に高い効果を示します。
- 既存の殺虫剤に抵抗性を持つ害虫にも優れた効果を示します。
- 紋枯病にも高い効果を示します。

適用病害虫と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	総使用回数*	使用方法	
稲	紋枯病 イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	1kg/10a	移植時		側条施用	
稲 (箱育苗)	紋枯病 イナゴ類 ウンカ類 イネツトムシ イネドロオイムシ イネヒメハモグリバエ イネミズゾウムシ コブノメイガ ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	育苗箱 〔30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ〕 1箱当り50g	は種前		本剤 1回 オキサズルフィル剤 1回 インビルフルキサム剤 1回	育苗箱の床土 又は覆土に 均一に混和する
		高密度に は種する場合は 1kg/10a 育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り 50～100g				
	育苗箱 〔30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ〕 1箱当り50g	は種時 (覆土前) ～移植当日		育苗箱の上から 均一に散布する		
	高密度に は種する場合は 1kg/10a 育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り 50～100g					
イネカラバエ	育苗箱 〔30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ〕 1箱当り50g	移植当日				
	高密度に は種する場合は 1kg/10a 育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り 50～100g					

### ■使用上の注意

- 本剤を床土または覆土に混和する場合、処理後速やかに使用してください。また、本剤を処理した床土または覆土を放置しないでください。
- 育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機にかけて移植してください。
- 育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5ℓ）1箱当りに乾粕として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を50から100gまでの範囲で調整してください。
- 薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように処理してください。また、土壌全面に不透水性無孔シートを敷くなど、薬剤処理後の灌水による土壌への浸透をさけてください。
- 側条施用する場合は、粒剤が均一に散布できる施用装置を装着した田植機を使用してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

### ■薬害

- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗等には薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後田面が露出しないように注意してください。
- 低温での育苗条件では生育抑制を生じるおそれがあるので、温度管理に注意してください。

### ■水産動植物への注意

- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。また、本剤を使用した苗は養魚田に移植しないでください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。

### ■安全使用上の注意



- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

### ■貯蔵上の注意

- 密封し、直射日光を避け、食品と区別してなるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2024年7月25日現在の登録内容に基づいています。