

殺虫剤

協友

ダニサラバ® フロアブル

シフルメトフェン 20.0%

種類名／シフルメトフェン水和剤
農林水産省登録／第22035号
毒性／普通物^{*}
有効年限／3年
包装／500ml×20

特 長

- 既存の殺ダニ剤と異なる新規骨格を有する殺ダニ剤です。
- 既存剤に対して感受性の低下したハダニ類にも有効で、優れた残効性を示します。
- 各種ハダニ類の全ステージに対して高い活性を有しますが、特に幼虫に対する効果に優れています。
- 天敵・有用昆虫への影響が少なくIPM(総合的病害虫管理)に適しています。

適用害虫と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
かんきつ	ミカンハダニ	1000～ 2000倍	200～1000ℓ	収穫前日まで		
ぶどう	ブドウヒメハダニ	1000倍	200～700ℓ	収穫14日前まで	2回	散布
りんご かわき		1000～ 2000倍	100～500ℓ	収穫前日まで		
なし もも ネクタリン おうとう 小粒核果類 いちじく		1000倍	100～350ℓ	収穫14日前まで		
ホップ						
アスパラガス						
すいか メロン きゅうり いちぢく なす ピーマン やまいも みょうが(花穂) モロヘイヤ セルリー みつば さやいんげん かんしょ	ハダニ類	1000倍	100～350ℓ	収穫前日まで		
しそ科葉菜類		2000倍		収穫14日前まで		
なんてん(葉)				収穫7日前まで		
てんさい		1000倍		みょうが(花穂) の収穫前日まで 但し、花穂を収 穫しない場合に あっては開花期 終了まで		
みょうが(茎葉)						

(つづく)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
食用 と う が ん	ハダニ類	1000倍	100～350 ℥	収穫3日前まで		
茶	カンザワハダニ	1000～ 2000倍	200～400 ℥	摘採7日前まで	2回	散布
花 き 類 ・ 観 葉 植 物	ハダニ類	1000倍	100～350 ℥	発生初期		

使用にあたって

■使用上の注意

- 使用前には必ず容器を振り、使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤は植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の裏表に十分に散布してください。
- ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布ムラのないようにていねいに散布してください。
- ハダニ類は薬剤抵抗性が発達し易いので、できるだけ年1回の散布とし、作用性の異なる他の薬剤と輪番で使用してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- ボルドー液との混用はさけてください。また、ボルドー液との近接散布は14日以上間隔をあけてください。
- ぶどうに使用する場合、無袋栽培においては果粉溶脱のおそれがあるため果実肥大期（大豆粒大）以降の散布はさけてください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合には、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■安全使用上の注意

-  ●散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
-  ●かぶれやすい体质の人は取扱いに十分注意してください。

■貯蔵上の注意

- 密栓し、直射日光のあたらない低温な場所に保管してください。

本資料の記載内容は2025年2月10日現在の登録内容に基づいています。