

## 殺菌剤

協友

# ラブサイド®フロアブル

フサライド..... 20.0%

種類名/フサライド水和剤  
農林水産省登録/第21658号

毒性/普通物\*

有効年限/5年(500mℓ)、3年(5ℓ、20ℓ)

包装/500mℓ×20、5ℓ×4、20ℓ

## 特 長

- 無人ヘリ散布、地上散布のいずれにも適したいもち防除剤です。
- 早めの防除で葉いもち、穂いもちに優れた効果を発揮し、耐雨性、残効性にも優れています。
- 耐性菌の出現が起こりにくい薬剤です。

## 適用病害と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用病害名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
稲	いもち病	1000~1500倍	60~150ℓ	収穫7日前まで	3回	散布
		300倍	25ℓ			
		原液	120~150mℓ			空中散布
		30倍	3~4ℓ			
		5~8倍	800mℓ			

## 使用にあたって

### ■使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
- いもち病発生に際して予防的に散布した方がより効果的です。葉いもちに対しては発生が予想される場合、または初発生をみたら直ちに散布してください。
- 本剤は貯蔵中に沈殿を生じることがありますが、振れば容易に元の状態に戻るので、使用に際しては、容器をよく振って均一な状態にしてから所定量をとり出し、水に入れてよく攪拌して所定濃度の散布液を調製してください。
- 空中散布・無人ヘリコプター散布に関する注意は「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機（無人ヘリコプター等）散布・滴下に関する注意」をご参照ください。
- 空中散布および無人ヘリコプターによる散布に使用する場合、散布薬液の飛散により他作物に薬害を生じるおそれは少ないですが、なお散布区域内に栽培されている作物等に留意してください。また、散布薬液の飛散によって自動車の塗装等に被害を生じるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分注意してください。
- 本剤を水田の水稻に対して希釈倍数300倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度運動式地上液剤少量散布装置を使用してください。

### ■安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。



- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。

また、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。

- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

■貯蔵上の注意

- 密栓し、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2024年7月25日現在の登録内容に基づいています。