

# 殺虫剤

協友

## スミチオン<sup>®</sup>粉剤3DL

MEP .....3.0%

種類名/MEP粉剤  
農林水産省登録/第21877号  
毒性/普通物\*  
有効年限/4年  
包装/3kg×8

### 適用害虫と使用方法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用場所	適用害虫名	10a当り 使用量	使用時期	総使用回数*	使用 方法
稲	—	ニカメイチュウ ウンカ類 コブノメイガ カメムシ類 イネドロオウムシ アザミウマ類	3~4kg	収穫21日 前まで	本剤 2回 [但し、出穂前は1回] MEP剤 3回 [種もみへの処理は1回、 育苗箱散布は1回、本 田では2回]	散布
		アワヨトウ	4kg			
水田作物、 畑作物 (休耕田)	ヨシ、オギ、ススキ、 セイタカアワダチソ ウ等の多年生雑草が 優占している休耕田	カメムシ類	3~4kg	—	4回	
だいず	—		4kg	収穫21日 前まで		

### 使用にあたって

#### ■使用上の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく、流動性が良いので、散布の際は散布機の開度を一目盛り程度しぼって散布してください。
- 本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に薬剤がかかると変色するおそれがあるので、薬剤がかからないように注意してください。



- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。

- ①ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。
- ②関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。

#### ■薬害

- あぶらな科作物には薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合には、かからないように注意して散布してください。

#### ■毒害

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

#### ■水産動植物への注意

- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

#### ■安全使用上の注意

- 本剤の解毒剤としては硫酸アトロピン製剤およびPAM製剤が有効であると報告されています。

- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。



- 散布の際は農薬用マスクなどを着用してください。作業後はうがいをしてください。

#### ■貯蔵上の注意

- 密封し、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2024年7月25日現在の登録内容に基づいています。