

## 殺虫殺菌剤

# スタウト<sup>®</sup> ダントツ<sup>®</sup> 箱粒剤

クロチアニジン ..... 1.5%  
イソチアニル ..... 2.0%

種類名／クロチアニジン・イソチアニル粒剤  
農林水産省登録／第22698号(住友化学登録)  
毒性／普通物<sup>\*</sup>  
有効年限／5年  
包装／1kg×12、10kg

### 特 長

- 本剤はいもち病に高い効果のある新規有効成分イソチアニル(スタウト)と水稻初期害虫等の防除に定評のあるクロチアニジン(ダントツ)との混合箱粒剤です。
- いもち病や幅広い水稻初期害虫(イネミズヅウムシ、イネドロオイムシ)に優れた効果を示します。さらにウンカ類、ツマグロヨコバイにも有効です。
- は種時から移植時まで幅広い時期での使用が可能です。
- 稻に対して安全性が高いことが確認されています。

### 適用病害虫と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	総使用回数*	使用方法
稻 (箱育苗)	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病 いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 穂枯れ (こま葉枯病菌) 内穎褐変病 イネミズヅウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ ニカメイチュウ イネヒメハモグリバエ	育苗箱 [30×60×3cm、 使用土壤約5ℓ] 1箱当たり50g	は種前	本剤 クロチアニジン剤 1回 イソチアニル剤 4回 「移植時までの処理は1回、 本田での散布、空中散布、 無人航空機散布は合計3回」 イソチアニル剤 3回 「移植時までの処理は1回、 本田では2回」	育苗箱の床土 又は 覆土に均一に 混和する
	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 穂枯れ (こま葉枯病菌) 内穎褐変病 イネミズヅウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ ニカメイチュウ イネヒメハモグリバエ	育苗箱 [30×60×3cm、 使用土壤約5ℓ] 1箱当たり50g			
	高密度に は種する場合は 1kg/10a 育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壤約5ℓ) 1箱当たり50~100g	高密度に は種する場合は 1kg/10a 育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壤約5ℓ) 1箱当たり50~100g	は種時 (覆土前) ~移植當日		
	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病	育苗箱 [30×60×3cm、 使用土壤約5ℓ] 1箱当たり50g	は種時 (覆土前)	育苗箱の上から 均一に散布する	
	高密度に は種する場合は 1kg/10a 育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壤約5ℓ) 1箱当たり50~100g	高密度に は種する場合は 1kg/10a 育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壤約5ℓ) 1箱当たり50~100g			

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	総使用回数*	使用方法
稻	いもち病 イネミズヅウムシ イネドロオイムシ	1kg/10a	移植時	本剤 1回 クロヂアニジン剤 4回 「直播でのは種時又は移植時までの処理は1回、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回」 イソチアニル剤 3回 「直播でのは種時又は移植時までの処理は1回、本田では2回」	側条施用  は種同時施薬機を用いて土中施用する
			は種時	本剤 1回 クロヂアニジン剤 4回 「は種時までの処理は1回、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回」 イソチアニル剤 3回 「は種時までの処理は1回、本田では2回」	

### 使用にあたって

#### ■使用上の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 床土または覆土に混和する場合、処理後速やかに使用してください。また、処理した床土または覆土を放置しないでください。
- 育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機にかけて移植してください。
- 育苗箱(30×60×3cm、使用土壤約5ℓ)1箱当たりに乾粉として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を50から100gまでの範囲で調整してください。
- 側条施用する場合は、粒剤が均一に散布できる施用装置を装着した田植機を使用してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

#### ■薬害

- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗等には薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後田面が露出しないように注意してください。
- いぐさ栽培予定の水田では使用しないでください。また、本剤を処理した稻苗を移植した水田ではいぐさを栽培しないでください。
- きく等の他作物に影響を及ぼす場合があるので、薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように散布してください。また、土壤全面に不透水性無孔シートを敷くなど、薬剤処理後の灌水による土壤への浸透をさけてください。

#### ■水産動植物への注意

- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 敷布後は水管理に注意してください。

#### ■安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

#### ■貯蔵上の注意

- 密封し、直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。