

殺虫剤

協友

アディオン®フロアブル

ベルメトリン..... 10.0%

種類名/ベルメトリン水和剤
農林水産省登録/第21664号
毒性/普通物*
有効年限/5年
包装/500ml×20

特 長

- 合成ピレスロイド系殺虫剤です。
- フロアブル剤ですので、粉立ちしません。

適用害虫と使用方法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。


作物名	適用害虫名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法	
大粒種ぶどう	チャノキイロアザミウマ	1000～ 2000倍	200～ 700ℓ	収穫7日前まで	5回	散布	
	コガネムシ類 フタテンヒメヨコバイ	1500倍					
おうとう	オウトウハマダラミバエ ショウジョウバエ	2000倍		収穫前日まで	2回		
もも	モモハモグリガ	1500～ 2000倍			6回		
	シンクイムシ類 アブラムシ類	1500倍			2回		
りんご	キンモンホソガ	1500～ 2000倍		1500倍	収穫14日前まで		本剤 2回 ベルメトリン剤 4回 [散布は2回、 噴射は2回]
	ケムシ類 アブラムシ類 ハマキムシ類 モモチョッキリゾウムシ シンクイムシ類						
なし	シンクイムシ類 カメムシ類	1500～ 2000倍		1500～ 2000倍	収穫前日まで		2回
	アブラムシ類						
くるみ	アメリカシロヒトリ シロテンクロマイコガ	1500倍		1500倍	収穫7日前まで		3回
マルメロ	シンクイムシ類	2000倍			収穫14日前まで		
ブルーベリー	オウトウショウジョウバエ	2000倍			収穫前日まで		
かき	アザミウマ類 カメムシ類	1000～ 1500倍			収穫7日前まで		
アスパラガス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1500倍		100～ 500ℓ	収穫前日まで		6回
きくら ば カーネーション	アブラムシ類		100～ 300ℓ	—			
宿根かすみそう	アブラムシ類 ヨトウムシ						
スターチス	ヨトウムシ						

(つづく)


作物名	適用害虫名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
りんどう	リンドウホソハマキ ヒラズハナアザミウマ	1500倍	100～ 300ℓ	—	6回	散布
トルコギキョウ	ヒラズハナアザミウマ		200～ 700ℓ			
つつじ類	ツツジグンバイ					

使用にあたって


■使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 使用前によく振ってから使用してください。
-  ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ① ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。
 - ② 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - ③ 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。


■蚕 毒

-  蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれのある場所では使用しないでください。

■水産動植物への注意

-  水産動植物（魚類）に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼および海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

■安全使用上の注意

- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当てを受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 本剤による中毒の治療法としては、動物実験でメトカルバモール製剤の投与が有効であると報告されています。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中および散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係ない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
-  散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。

■貯蔵上の注意

- 密栓し、直射日光をさけ、食品と区別してなるべく低温な場所に保管してください。