

殺菌剤

ピクシオ® DF

フェンピラザミン…………… 50.0%

種類名／フェンピラザミン水和剤
 農林水産省登録／第23298号(住友化学登録)
 毒性／普通物*
 有効年限／5年
 包装／250g×20

特 長

- 灰色かび病・菌核病に高い効果を示します。
- 高い予防効果に加え、優れた治療効果(病斑進展阻止効果)を有します。
- 浸透性、浸透移行性に優れ、作物の内部に侵入した菌に対しても高い効果を発揮します。
- 既存薬剤に耐性を示す灰色かび病菌にも高い効果を示します。
- 製剤は粉立ちが少なく取扱いやすいDF(ドライフロアブル)です。水にも溶けやすく、泡立ちも少ない製剤です。

適用病害と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用病害名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法	
か ん き つ ぶ ど う	灰色かび病	2000倍	200～700 ℓ	収穫前日 まで	3回	散布	
も も	灰星病						
き ゅ う り ト マ ト ミ ニ ト マ ト な す	灰色かび病 菌核病		100～300 ℓ		4回		
豆 類 (未成熟)	菌核病						
す い か メ ロ ン							3回
ピ ー マ ン	灰色かび病 菌核病				発病初期		4回
花き類・観葉植物	灰色かび病						

使用にあたって

■使用上の注意

- 薬液の調製は、まず本剤の所定量に少量の水を加えてかき混ぜ、その後所定量となるよう水を加え十分攪拌してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 施設で使用したあと、施設内に臭気が残る場合には換気を行ってください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合には、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■ 蚕 毒



- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。かかった場合7日間 は給桑しないでください。

■安全使用上の注意

- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

■貯蔵上の注意

- 密封し、直射日光をさけ、食品と区別してなるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2024年7月25日現在の登録内容に基づいています。