

## 殺虫剤

# ネコナカット®フロアブル

エトキサゾール……………5.0%

種類名／エトキサゾール水和剤  
農林水産省登録／第24639号  
毒性／普通物\*  
有効年限／4年  
包装／500ml×20

## 特 長

- 新規系統のネダニ、ケナガコナダニ剤です。
- ネダニ類、ケナガコナダニ類の脱皮を阻害し、幼若虫に優れた効果を発揮します。
- 収穫前日数が短く、使い勝手の良い薬剤です。
- 作物への安全性が高く、安心して使えます。

## 適用害虫と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
ほうれんそう	ケナガコナダニ類	1000倍	100～300 ℓ / 10a	収穫3日前まで	2回	散布
に ら	ネダニ類		3 ℓ / m <sup>2</sup>	収穫7日前まで	1回	株元灌注

## 使用にあたって

### ■使用上の注意

- 使用前に必ず容器をよく振ってから使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製使いきってください。
- ボルドー液との混用はさけてください。(効果)
- 本剤は植物体への浸透移行性がないので、散布の際はかけ残しのないように葉の裏表に十分に散布してください。
- 本剤は殺卵、殺幼虫力は強いが、殺成虫力が弱く遅効的であるため、誤ってまき直しなどしないように注意してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

### ■蚕 毒

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

### ■水産動植物への注意



- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

### ■安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。

### ■貯蔵上の注意

- 密栓し、直射日光をさけ、なるべく低温な場所に保管してください。