

## 殺菌剤

# フセキ<sup>®</sup> フロアブル

ピリダクロメチル…………… 35.0%

種類名／ピリダクロメチル水和剤  
農林水産省登録／第24777号(住友化学登録)  
毒性／普通物<sup>\*</sup>  
有効年限／5年  
包装／250mℓ×20

### 特 長

- 新規殺菌成分ピリダクロメチルを含有する殺菌剤です。
- ダイズ紫斑病に優れた効果を示します。
- 新規作用性を有し、既存薬剤の耐性菌(\*)にも高い効果を発揮します。

\*ベンズイミダゾール剤、QoI剤耐性菌で確認。

### 適用病害と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用病害名	希釀倍数	10a当り 使用液量	使用時期	総使用回数 <sup>*</sup>	使用方法
小 麦	紅色雪腐病	2000倍	60～150 ℥	根雪前	2回	散布
だ い す	紫斑病	3000～4000倍	100～300 ℥	収穫前日まで	3回	
		24～32倍	0.8 ℥		無人航空機 散布	
て ん さ い	褐斑病	2000～3000倍	100～300 ℥	収穫7日前まで		散布

### 使用にあたって

#### ■使用上の注意

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 無人航空機散布に関する注意については「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機(無人ヘリコプター等)散布・滴下に関する注意」をご参照ください。
-  ●散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等に影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

#### ■蚕 毒

-  ●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかかるないようにしてください。かかった場合14日間は給桑しないでください。

#### ■生活環境動植物への注意

- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

#### ■安全使用上の注意

- かぶれやすい体质の人は取扱いに十分注意してください。

#### ■貯蔵上の注意

- 密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温な場所に保管してください。