

**適用拡大登録**

区 分	殺菌剤
農 薬 名	パレード 20 フロアブル
種 類 名	ピラジフルミド水和剤
登 録 番 号	第 24071 号
登 録 会 社	日本農薬株式会社
登 録 日	令和 6 年 6 月 26 日

**登録内容**

農薬登録申請書第 7 項を以下のとおり変更する（変更後は別紙）。

- 1)適用病害虫名の追加：さやえんどう/うどんこ病（2000～4000 倍）  
たまねぎ/黒腐菌核病（2000 倍）  
アスパラガス/斑点病（2000 倍）
- 2)使用方法の追加： うり類（成熟）（うどんこ病）：16 倍（1.6L/10a）、20 倍（2.0L/10a）、  
32 倍（3.2L/10a）、無人航空機による散布  
ねぎ（黒腐菌核病）/25～50 倍、5～10 分間苗根部浸漬
- 3)総使用回数の変更：ねぎ 3 回以内（灌注は 1 回以内）⇒3 回以内（灌注及び浸漬は合計 1 回以内）

**使用上の注意事項**

農薬登録申請書第 10 項「水産動植物に有毒な農薬については、その旨」を以下のとおり変更する。

**【変更前】**

この登録に係る使用方法では該当がない。

**【変更後】**

浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。

別紙

【変更後】(変更する作物のみ抜粋)

7. 適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
さやえんどう	菌核病 灰色かび病 褐紋病 うどんこ病	2000～ 4000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3 回 以内	散布	3 回以内
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	2000～ 4000 倍	100～300L/10a				
	黒腐菌核病	2000 倍					
	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	20 倍	1.6L/10a				
		25 倍	2.0L/10a				
40 倍		3.2L/10a					
アスパラガス	茎枯病	2000 倍	100～700L/10a			散布	
	斑点病	2000 倍					
うり類 (成熟)	うどんこ病 つる枯病 (すいか、メロン) 菌核病 (すいか、メロン)	2000～ 4000 倍	100～300L/10a			散布	
		うどんこ病	16 倍				
	20 倍		2.0L/10a				
	32 倍		3.2L/10a				
ねぎ	黒腐菌核病	100 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱または、ペーパーポット 1 冊 (約 30×60cm、使用土壌約 1.5～4L) 当り 0.5L	育苗期後半～定植当日	1 回	灌注	3 回以内 (灌注及び浸漬は合計 1 回以内)
	黒腐菌核病	25～ 50 倍	—	定植直前		5～10 分間 苗根部浸漬	
	黒斑病 葉枯病 小菌核腐敗病 小菌核病	2000～ 4000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3 回 以内	散布	
	さび病 黒腐菌核病 白絹病	2000 倍					