

適用拡大登録

区 分	殺菌剤
農 薬 名	カナメフロアブル
種 類 名	インピルフルキサム水和剤
登 録 番 号	第 24265 号
登 録 会 社	住友化学株式会社
登 録 日	令和 6 年 9 月 11 日

登録内容

農薬登録申請書第 7 項「適用病害虫の範囲及び使用方法」を以下のとおり変更し、別紙のとおりとする。

- ・作物名「トマト」および「ミニトマト」に適用病害虫名「褐色輪紋病」、「斑点病」を追加する。
- ・作物名「ばれいしょ」の希釈倍数「400倍」を「400～1000倍」に変更する。
- ・作物名「ねぎ」の希釈倍数「4000倍」、使用方法「散布」に適用病害虫名「白絹病」を追加する。
- ・作物名「さやえんどう」に適用病害虫名「うどんこ病」を追加する。
- ・作物名「りんご」に適用病害虫名「灰色かび病」を追加する。
- ・作物名「なし」の希釈倍数「4000倍」に適用病害虫名「胴枯病」を追加する。
- ・作物名「もも」の希釈倍数「4000倍」に適用病害虫名「褐さび病」を追加する。
- ・作物名「小麦」を追加し、それに伴い、作物名「麦類」を「麦類（小麦を除く）」に変更する。

使用上の注意事項

変更なし

別紙

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イピルホキサムを含む農薬の総使用回数	
トマト ミニトマト	うどんこ病 褐色輪紋病 菌核病 すすかび病 灰色かび病 葉かび病 斑点病	4000 倍	100~300 L/10a	収穫前日まで	4 回以内	散布	4 回以内	
ばれいしょ	黒あざ病	400~1000 倍	—	植付前	1 回	種いも瞬間浸漬	4 回以内 (種いもへの処理は 1 回以内、 植付後は 3 回以内)	
	夏疫病	4000 倍	100~300 L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布		
ねぎ	黒斑病 白絹病 葉枯病				4 回以内		株元散布	
	さび病							4000~8000 倍
	黒腐菌核病							4000 倍
白絹病	4000~8000 倍							
さやえんどう	うどんこ病 菌核病 さび病 灰色かび病	4000 倍	200~700 L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内	
りんご	赤星病 うどんこ病 褐斑病 黒星病 黒点病 すす点病 すす斑病 灰色かび病 斑点落葉病 モリア病							
なし	黒斑病 胴枯病 輪紋病	4000 倍	4000~8000 倍	散布	4 回以内 (根雪前は 2 回以内、 根雪後は 2 回以内)			
	赤星病 黒星病							
もも	うどんこ病 褐さび病 黒星病	4000 倍	4000~8000 倍	散布	4 回以内 (種子への処理は 1 回以内、 根雪前の散布は 2 回以内、 根雪後の散布は 2 回以内)			
	灰星病							
麦類(小麦を除く)	雪腐小粒菌核病	2000~4000 倍	60~150 L/10a	根雪前	2 回以内			
	うどんこ病	4000 倍		収穫 7 日前まで				
	赤さび病	4000~8000 倍						
小麦	雪腐小粒菌核病	2000~4000 倍	60~150 L/10a	根雪前	2 回以内			
	うどんこ病	4000 倍		収穫 7 日前まで				
	赤さび病	4000~8000 倍						